


# BCG vaccinatie

## vaccinatie tegen tuberculose

### Wat kunt u verwachten na de BCG vaccinatie?

- Uw kindje wordt niet ziek van deze vaccinatie en krijgt geen koorts.
- Ongeveer 4-8 weken na de BCG vaccinatie kan er een ontsteking/zweertje ontstaan dat langzaam groter wordt.
- Deze plek kan open gaan en er kan bloed/pus uit komen.
- Het zweertje gaat vanzelf weer weg, dit kan weken tot maanden duren.
- Nadat het zweertje genezen is blijft er een klein litteken te zien.



### Wat mag u **NIET** doen!



- NIET aanraken of uitknijpen
- Niet insmeren met zalf of crème
- Afplakken met een pleister

### Wat mag u **WEL** doen!



- Uw kindje mag gewoon in bad/douchen
- Een droog gaasje plakken (als het zweertje erg bloederig of pussig is)

**Let op:** als u opgezette hals- en/of okselklieren klieren voelt of u vertrouwt de BCG reactie niet, kunt u contact opnemen met de TBC-afdeling via

GGD Kennemerland  
tuberculosebestrijding  
Spaarnepoort 5  
2134 TM Hoofddorp  
023 - 7891620

of TBC@VRK.nl